

February 1, 2015

Dear Parents and Guardians,

The CDC has reported an outbreak of measles in the U.S. currently involving eleven states. The Verona Area School District would like to take this opportunity to provide some information about measles and how to prevent it.

Measles is the most deadly of all childhood rash/fever illnesses. It is a serious infection that causes fever, cough, a rash, sore eyes, and occasionally dangerous complications. Measles spreads very easily, so it is important to protect against infection. Getting vaccinated is the best way to prevent measles.

Specifically, to have the best protection against measles, two doses of MMR vaccine are required. As part of the childhood immunization program the first dose of vaccine is required between 12 -15 months and the second dose before entering school, at 4 – 6 years.

It is important for you to check your child's immunization records to make sure he/she has received two doses of MMR vaccine. Measles can spread easily to and from unimmunized children. In addition to being at risk for getting sick if exposed to measles, children with one or zero doses of MMR will not be able to come to school for two weeks if exposed. If you believe that your child needs the MMR vaccine, please call your health care provider or local health department.

A fact sheet about measles is available in the link below this letter. If your child does develop a rash with a fever, they should not attend school and you should call your health care provider. Please tell the clinic you suspect your child may have measles. It is important to call the clinic or hospital before taking your child in.

Please remember – the best way to protect your child is to ensure they have had two doses of MMR.

Estimados padres y tutores:

El Centro para el Control de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha informado un brote de sarampión en los Estados Unidos que en la actualidad afecta a once estados.

El sarampión es la enfermedad más letal de todas las enfermedades infantiles que producen sarpullidos y fiebre. Es una infección grave que causa fiebre, tos, sarpullidos, irritación de los ojos y en ocasiones puede producir complicaciones graves. El sarampión se contagia con mucha facilidad, de modo que es importante protegerse de la infección. La vacuna es la mejor medida de prevención contra el sarampión.

Específicamente, para contar con la mejor protección contra el sarampión, se requieren dos dosis de la vacuna MMR. Como parte del programa de inmunización infantil, la primera dosis de

la vacuna se debe administrar entre los 12 y 15 meses y la segunda dosis, antes de ingresar a la escuela, entre los 4 y 6 años.

Es importante que verifique los registros de vacunación de su hijo para asegurarse de que haya recibido las dos dosis de la vacuna MMR. Los niños que no fueron vacunados pueden contagiar el sarampión y también ser contagiados con facilidad. Además de estar en riesgo de contagiarse si están expuestos al sarampión, los niños que solo tengan una o ninguna dosis de MMR no podrán asistir a la escuela durante dos semanas si estuvieron expuestos. Si cree que su hijo necesita darse la vacuna MMR, comuníquese con su proveedor médico o departamento de salud local.

Incluimos una hoja informativa sobre el sarampión junto con esta carta. Si su hijo tiene sarpullidos con fiebre, no debería asistir a la escuela y debería llamar a su proveedor médico. Dígale a la clínica que cree que su hijo podría tener sarampión. Es importante que llame a la clínica o al hospital antes de llevar a su hijo.

Recuerde, la mejor forma de proteger a su hijo es asegurarse de que tenga las dos dosis de la vacuna MMR.